

新潟県内で今年に入って初めてとなるノロウイルスによる食中毒が発生しました。また、全国的にも大規模な食中毒の発生が相次いでいます。例年3月～4月頃まで流行が続くため、予防対策を継続して実施しましょう。

ノロウイルスに感染した人のおう吐物には大量のノロウイルスが含まれています！

おう吐物が衣服に付いたときの消毒方法

<消毒の前に>

- ペーパータオルで、できる限り衣服からおう吐物を取り除く。
- 洗剤入りの水の中でもみ洗います。(ウイルスが飛び散らないように注意！)



<消毒方法…以下の2つの方法があります。>

- (1) 85℃で1分以上の熱水洗濯
- (2) 0.02%次亜塩素酸ナトリウム液(塩素系漂白剤)※

※ 消毒後は十分にすすぎ、高温の乾燥機を使用すると殺菌効果が高まります。


<消毒のあとは>

- 処理した場所や、使用した用具は、0.02%次亜塩素酸ナトリウム液で消毒したあと、洗剤を使用してよく洗いましょう。
- 手洗い・うがいは忘れずに。

※ 0.02%次亜塩素酸ナトリウム液の作り方は、「にいがた食の安全インフォメーション」に掲載の「防ごう！ノロウイルス食中毒」パンフレットをご覧ください。

感染性胃腸炎定点当たりの報告数※(感染症サーベイランス)

※報告対象医療機関当たりの感染性胃腸炎(ノロウイルス以外も含む)の患者数



次号は、平成29年3月17日頃に発行予定です。

<H29.2.20～H29.2.26>

保健所ごとの報告数(定点当たり)

| | |
|-----|-----------|
| 新潟市 | 5.76 (↓) |
| 新発田 | 4.80 (↑) |
| 新津 | 0.50 (↑) |
| 三条 | 5.50 (↓) |
| 長岡 | 9.50 (↓) |
| 魚沼 | 19.00 (↑) |
| 南魚沼 | 0.50 (↓) |
| 十日町 | 2.00 (↓) |
| 柏崎 | 5.00 (↓) |
| 糸魚川 | 3.50 (↓) |
| 村上 | 0.00 (↓) |
| 佐渡 | 0.00 (↓) |
| 上越 | 13.83 (↓) |

※ ()内は、ノロウイルス情報第8号発行時との比較
(↑:増加、↓:減少、-:増減なし)



詳しい予防のポイントは、新潟県ホームページ内「にいがた食の安全インフォメーション」をご覧ください。
ネットで「にいがた食の安全」と検索(<http://www.fureaikan.net/syokuinfo/>)し、最新情報の「ノロウイルス情報を掲載しました」からご覧いただけます。

<お問い合わせ> ◆生活衛生課 ☎025(280)5205 ◆健康対策課 ☎025(280)5200
もしくは 最寄りの地域振興局健康福祉(環境)部(保健所)まで

