

# ノロウイルス情報 第4号

県内における定点医療機関あたりの感染性胃腸炎の報告数は増加しており、報告数が10を超えている地域もあります。食中毒発生の危険性も高まりますので、予防対策を徹底しましょう。

## 感染を防ぐため、手洗いの徹底を！


ノロウイルスは手指を介して感染が広がります。調理前、食事前、トイレの後、おう吐物等を処理した後は、石けんを用いて流水でよく手を洗い、ウイルスを食品に「つけない」ことで食中毒を予防しましょう。

- ① 時計や指輪をはずす。
- ② 水で手をぬらし、石けん液をつける。
- ③ よく泡立て、手の平と甲⇒指の間(親指も)⇒指先⇒手首の順で念入りに洗う。
- ④ 流水で十分にすすぐ。
- ⑤ ペーパータオル等で衛生的に手を乾燥させる。
- ⑥ 消毒用アルコールを噴霧し、手指にすり込む。

②～④を2回行くとより効果的です！

### 感染性胃腸炎定点当たりの報告数※(感染症サーベイランス)

※報告対象医療機関当たりの感染性胃腸炎(ノロウイルス以外も含む)の患者数



<H30.12.10~12.16>

#### 保健所ごとの報告数(定点当たり)

新潟市	8.76 (↑)
新発田	7.60 (↑)
新津	- (-)
三条	1.40 (↑)
長岡	5.75 (↑)
魚沼	3.00 (↓)
南魚沼	0.50 (↓)
十日町	3.50 (↓)
柏崎	8.00 (↑)
糸魚川	0.50 (↓)
村上	0.50 (↑)
佐渡	2.00 (↓)
上越	12.00 (↑)

※ ( )内は、ノロウイルス情報第3号発行時との比較  
(↑:増加、↓:減少、-:増減なし)

次号は、平成31年1月11日頃に発行予定です。



詳しい予防のポイントは、新潟県ホームページ内「にいがた食の安全インフォメーション」をご覧ください。  
ネットで「にいがた食の安全」と検索(<http://www.fureaikan.net/syokuinfo/>)し、最新情報の「ノロウイルス情報を掲載しました」からご覧いただけます。

