


# ノロウイルス情報

冬はノロウイルスによる感染症や食中毒が発生しやすい時期です。引き続き予防対策を実践しましょう！

## 感染性胃腸炎 定点当たりの報告数※ R6.2.12~2.18

※ 報告対象医療機関あたりの患者数。ノロウイルス以外も含む。



### 保健所ごとの報告数

新潟市	4.31	(↓)
新発田	7.50	(↓)
新津	0.00	(-)
三条	0.60	(↓)
長岡	1.88	(↑)
魚沼	6.50	(↓)
南魚沼	0.50	(-)
十日町	1.00	(↓)
柏崎	2.67	(↓)
糸魚川	9.00	(↓)
村上	0.00	(-)
佐渡	7.00	(↓)
上越	10.40	(↓)

( ) 内は、前号発行時との比較

↑：増加、↓：減少、-：増減なし

## ノロウイルスには塩素系消毒剤（漂白剤）による消毒が有効です

### おう吐物や便で汚れた箇所の消毒

【0.1% (1,000ppm) 消毒液の作り方】

用意するもの → 500mLペットボトル (空のもの)  
塩素系の消毒剤又は漂白剤 (いずれも原液6%)



- ① 空の500mLペットボトルに、キャップ2杯分の塩素系消毒剤（漂白剤）を入れる。
- ② ペットボトルがいっぱいになるまで水を加える
- ③ 完成  
誤飲防止のため「消毒液」と表示

### 定期消毒

【0.02% (200ppm) 消毒液の作り方】

左記の作り方のうち、ペットボトルの容量を500mLから2Lに変えると、0.02% (200ppm) 消毒液となります。



直接手で触れる場所（おもちゃやドアノブなど）の定期消毒に使用できます。

ノロウイルスに関する情報は、新潟県ホームページ「食の安全インフォメーション」で！



にいがた 食の安全

検索

<お問い合わせ> ◆ 生活衛生課 ☎025(280)5205 ◆ 感染症対策・薬務課 ☎025(280)5200  
◆ 最寄りの地域振興局健康福祉(環境)部 (保健所)

# ノロウイルスとは

症 状：おう吐、下痢、腹痛などの胃腸炎症状

潜伏期間：約1～2日

流行時期：特に冬から春に流行するが、1年を通して発生

感染経路：


## 1. 人から人へ感染する(感染症)

感染者のおう吐物や便が室内環境を汚染し、周りの人に感染

## 2. ノロウイルスに汚染された食品を食べる(食中毒)

① ノロウイルス感染者が調理して食品を汚染

② ウイルスを取り込んだ二枚貝を加熱不十分な状態で食べる



# ノロウイルス食中毒：予防のポイント4原則

## 1. 持ち込まない

胃腸炎症状がある時は、**直接食品に触れない**



## 2. 拡げない

おう吐物や便は慎重に処理し、その後はしっかりと**消毒**



## 3. つけない

流水と薬用せっけんで**しっかり手を洗う**※

※ トイレの後、調理・食事の前など適切なタイミングで



## 4. やっつける

食品（特に二枚貝など）は、**中心部までしっかり加熱**※

※ 85～90℃で90秒間以上



症状がなくてもノロウイルスに感染している（不顕性感染）ことがあります。日頃から**予防のポイント4原則**を徹底しましょう。

# おう吐物や便で汚れた箇所の消毒：0.1%（1,000ppm）消毒液の作り方

用意するもの

500mLペットボトル（空のもの）  
塩素系の消毒剤又は漂白剤（いずれも原液6%）



このほか、

- 消毒の方法
- おう吐物の処理方法
- 正しい手洗いの方法 など

詳しくは、パンフレット『防ごう！ノロウイルス食中毒』をご覧ください。

県ホームページ「にいがた食の安全インフォメーション」又はこちらのQRコードから



ダウンロードできます。

ペットボトルの容量を500mLから2Lに変えると、0.02%（200ppm）消毒液となり、直接手で触れる場所（おもちゃやドアノブなど）の定期消毒に使用できます。